

[P-023]

Ref. No: 119

Analyzing the Temperament Pattern Among Affective Disorder Inpatients Admitted to Hospital of Psychiatry with Suicidal Thinking

Sevgin Ekşioğlu¹, Ümit Başar Semiz¹

¹Erenköy Research and Training Hospital for Mental and Neurological Disorders, Istanbul - Turkey
E-mail address: sevgineksioglu@yahoo.com

ABSTRACT:

Analyzing the temperament pattern among affective disorder inpatients admitted to hospital of psychiatry with suicidal thinking

Objective: The aim of this study is to assess suicidal idea in patients with mood disorders (unipolar depression, bipolar disorder) and to predict suicidal idea in these patients via examining a variety of clinical features and temperament characteristics.

Method: The study performed by affective disorder inpatients admitted consecutively Erenköy Research and Training Hospital for Mental and Neurological Disorders. The study was completed with 246 patients, who met the DSM-IV-TR diagnosis criteria for affective disorders by using Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) and Hamilton Depression Rating Scale score over 18, who were diagnosed to suffer depressive episodes and Young-Mania Rating Scale score over 13, who were diagnosed to have manic episode. All the patients were administered Beck Hopelessness Scale, the SCL-90R (psychological symptom screening test), Suicide Idea Scale and TEMS-A (Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego Autoquestionnaire).

Results: Suicide attempts in the past and the presence of depressive and cyclothymic temperament was concluded to predict the development of suicidal ideation in all affective disorder patients. While, in unipolar disorder patients, suicide attempt in the past, having cyclothymic temperament and somatic psychiatric symptoms predicting suicidal idea, also, in bipolar patients suicidal idea is predictable with having cyclothymic temperament and paranoid psychiatric symptoms.

Conclusion: Temperamental characteristics thought to be important in early recognition of and intervention to suicidal idea in affective disorders. Identifying temperamental characteristics with different studies and repeated results with larger sample and different axis-1 diagnoses should be important in assesment of suicidal idea.

Key words: Affective disorders, suicide, temperament

Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2012;22(Suppl. 1):S44

ÖZET:

İntihar düşüncesi nedeniyle psikiyatri servislerinde yatarak tedavi gören duyugudurum bozukluğu tanılı hastaların mizaç özellikleri yönünden incelenmesi

Amaç: Bu çalışmada, intihar fikirleri bulunan duyugudurum bozukluğu (unipolar depresyon, bipolar bozukluk) tanılı hastaların çeşitli klinik özelliklerinin ve mizaç özelliklerinin incelenerek, bu özelliklerden hangilerinin, intihar düşüncesi varlığına işaret ettiğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışma, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri servislerine ardışık olarak kabul edilen duyugudurum bozukluğu hastaları ile yapılmıştır. Çalışma, M.I.N.I. Plus 5.0.0 ölçeği kullanılarak, DSM-IV tanı ölçütlerine göre duyugudurum bozukluğu tanısı konulan Depresyon Derecelendirme Ölçeği'nde 18 ve üzeri puan alan depresif epizod tanılı, Young-Mani derecelendirme ölçeğinde 13 ve üzeri puan alan manik epizod tanılı 246 hasta ile tamamlanmıştır. Çalışmaya kabul edilen hastalara, Beck ümitsizlik ölçeği, SCL-90R (psikolojik belirti tarama testi), intihar niyeti ölçeği, TEMS-A (Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego Autoquestionnaire) uygulanmıştır.

Bulgular: Tüm duyugudurum bozukluğu tanılı hastalarda, geçmişte intihar girişimi bulunması ile depresif ve siklotimik mizaç özelliğine sahip olmanın intihar düşüncesine işaret ettiği tespit edilmiştir. Unipolar depresyon tanılı hastalarda, geçmişte intihar girişimi bulunması, siklotimik mizaç özelliklerine sahip olmak ve somatik belirtilerin ön planda olması, intihar düşüncesini öngördürmekten, bipolar bozukluk tanılı hastalarda geçmişte intihar girişimi öyküsü, siklotimik mizaç özellikleri ve paranoid belirtilerin ön planda olmasının intihar düşüncesini öngördürdüğü tespit edilmiştir.

Sonuç: Duyugudurum bozukluğu hastalarında, mizaç özelliklerinin değerlendirilmesinin, bu hastalarda, intihar düşüncesinin erken tespiti ve uygun yaklaşımla tedavisinin sağlanmasında önemli olacağı düşünülmektedir. Daha geniş örnekleme ve farklı Eksen-1 tanılarında çalışmanın yinelenerek, sonuçların karşılaştırmalı ele alınmasının klinik pratikte intihar düşüncesinin değerlendirmede önemli olabileceği açıktır.

Anahtar sözcükler: Duyugudurum bozuklukları, İntihar, mizaç

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012;22(Ek Sayı 1):S44